

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
05.03.2019 № 504
Реєстраційне посвідчення
№ UA/17294/01/01
UA/17294/01/02

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

КАРЖЕСТ
(CARGEST)

Склад:

діюча речовина: пеметрексед;

1 флакон містить 100 мг або 500 мг пеметрекседу (у вигляді пеметрекседу динатрію);

допоміжні речовини: маніт (E 421), натрію гідроксид, кислота хлористоводнева, вода для ін'єкцій, азот.

Лікарська форма. Порошок ліофілізований для приготування концентрату для розчину для інфузій.

Основні фізико-хімічні властивості:

Ліофілізований порошок від білого до світло-жовтого, або зелено-жовтого кольору.

Фармакотерапевтична група. Антиметаболіти. Структурні аналоги фолієвої кислоти.

Код ATX L01B A04.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка.

Пеметрексед є протипухлинним антифолатним засобом. Дослідження *in vitro* продемонстрували, що пеметрексед виступає антифолатним засобом різноспрямованої дії, пригнічуючи тимідилатсинтетазу (TS), дегідрофолатредуктазу (DHFR) і гліцинамід-рибонуклеотид-формілтрансферазу (GARFT), які є основними фолатзалежними ферментами для біосинтезу тимідину та пуринових нуклеотидів *de novo*, необхідні для реплікації клітин. Транспорт пеметрекседу до клітини відбувається за рахунок як редукованого переносника фолатів, так і транспортних систем мебранного протеїну, що зв'язує фолати. Потрапивши до клітини, пеметрексед трансформується в поліглютаматні форми за допомогою ферменту фолілполіглютаматсинтетази. Поліглютаматні форми є навіть більш сильними інгібіторами TS і GARFT, ніж пеметрексед. Поліглютамація є процесом, що залежить від часу та концентрації і відбувається в пухлинних клітинах і меншою мірою – у здорових тканинах. Метаболіти поліглютамату мають більш тривалий внутрішньоклітинний період напіввиведення, ніж вихідний лікарський засіб, що призводить до більш тривалої дії препарату в малігнізованих клітинах. Дані свідчать, що надекспресія тимідилатсинтази (TS) корелює зі зниженою чутливістю до пеметрекседу в ліній клітин, стійких до антифолатів. Результати дослідження зразків пацієнтів з недрібноклітинним раком легень (НДРЛ), які раніше не проходили курс хіміотерапії, показали зниження рівня експресії TS при adenокарциномі порівняно з пухлинами плоскоклітинної карциноми. Ці дані вказують на те, що пеметрексед може мати більшу ефективність для пацієнтів з adenокарциномою, порівняно з гістологією плоскоклітинної карциноми.

Досліди *in vitro* з клітиною лінією мезотеліоми MSTO-211H продемонстрували синергічні ефекти при комбінуванні пеметрекседу з цисплатином.

Фармакокінетика:

Гнатєв

Абсорбція

Пеметрексед призначений лише для внутрішньовенного введення.

Розподіл

Пеметрексед має сталий об'єм розподілу, що дорівнює 9 л/м². Дослідження *in vitro* показали, що приблизно 81 % пеметрекседу зв'язується протеїнами плазми. Ступінь ниркової недостатності не впливає на зв'язування препарату.

Метаболізм

Пеметрексед підлягає обмеженому печінковому метаболізму.

Виведення

70–90 % введеної дози пеметрекседу виводиться переважно із сечою в незміненому вигляді протягом перших 24 годин після застосування. Дослідження *in vitro* показали, що пеметрексед активно виводиться ОАТЗ (транспортер органічних аніонів). Загальний плазмовий кліренс пеметрекседу становить 92 мл/хв, а період напіввиведення з плазми – 3,5 години в пацієнтів з нормальнюю функцією нирок (кліренс креатиніну 90 мл/хв). Загальний системний вплив пеметрекседу (AUC) та максимальна концентрація в плазмі зростають пропорційно підвищенню дози. Фармакокінетика пеметрекседу є сталою протягом множинних циклів лікування. На фармакокінетичні властивості пеметрекседу не впливає супутнє застосування цисплатину. Застосування перорально добавки фолієвої кислоти та внутрішньом'язове застосування добавки вітаміну B12 не впливає на фармакокінетику пеметрекседу.

Пацієнти літнього віку

Не спостерігалося зв'язку між віком та фармакокінетикою пеметрекседу у діапазоні віку від 26 до 80 років.

Пацієнти з печінковою недостатністю

Не спостерігалося зв'язку між рівнями АсАт (SGOT), АлАт (SGPT), загального білірубіну та фармакокінетикою пеметрекседу. Однак вплив препарату в пацієнтів з порушеннями функції печінки (див. розділ «Особливості застосування») окремо не вивчали.

Пацієнти з нирковою недостатністю

З фармакокінетичного аналізу пацієнтів зі зниженою функцією нирок відомо, що загальний плазмовий кліренс і нирковий кліренс пеметрекседу знижуються зі зменшенням функції нирок. У середньому, у пацієнтів із кліренсом креатиніну 45 мл/хв загальний системний вплив пеметрекседу (AUC) на 56 % більше порівняно з пацієнтами з кліренсом креатиніну 90 мл/хв. (див. розділи «Особливості застосування» та «Спосіб застосування та дози»).

Клінічні характеристики

Показання

Злоякісна мезотеліома плеври.

Пеметрексед в комбінації з цисплатином показаний для лікування пацієнтів, які раніше не отримували хіміотерапевтичного лікування, зі злоякісною неоперабельною мезотеліомою плеври.

Недрібноклітинний рак легенів.

Пеметрексед в комбінації з цисплатином показаний для лікування хворих на місцеворозповсюджений або метастатичний недрібноклітинний неплоскоклітинний рак легенів у першій лінії хіміотерапії.

Пеметрексед як монотерапія показаний для підтримуючого лікування хворих на місцеворозповсюджений або метастатичний недрібноклітинний неплоскоклітинний рак легенів, у яких не було прогресування захворювання відразу після попередньої хіміотерапії препаратами платини.

Пеметрексед як монотерапія показаний для лікування хворих на місцеворозповсюджений або метастатичний недрібноклітинний неплоскоклітинний рак легенів у другій лінії хіміотерапії.

Протипоказання

- Гіперчувствливість до пеметрекседу або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

- Період годування груддю.
- Супутне застосування з вакциною проти жовтої лихоманки.

Особливі заходи безпеки

Як і під час роботи з іншими потенційно отруйними протипухлинними препаратами, слід приділяти велику увагу заходам безпеки при приготуванні та застосуванні розчину пеметрекседу. Рекомендується використовувати рукавички. У разі, якщо розчин пеметрекседу потрапив на шкіру, слід негайно промити шкіру водою з милом. Якщо розчин пеметрекседу потрапив на слизові оболонки, слід ретельно промити водою. Пеметрексед не має шкірно-наривних властивостей. Не існує специфічного антидоту у разі екстравазації (виходу препарату у позасудинний простір) пеметрекседу. Було зареєстровано декілька випадків екстравазації пеметрекседу, які не були віднесені спостерігачами до серйозних. Надавати допомогу в разі екстравазації препарату слід відповідно до локальних стандартів медичного закладу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Пеметрексед виводиться переважно нирками в незміненому вигляді, шляхом клубочкової фільтрації та і тубулярної секреції. Дослідження *in vitro* показали, що пеметрексед активно виводиться ОАТ3 (транспортер органічних аніонів) нирки. Дослідження *in vitro* також вказують на спорідненість пеметрекседу з ОАТ4, проте роль ОАТ4 у виведенні молекул нирками ще не повністю відома. Супутне застосування нефротоксичних препаратів (наприклад аміноглікозидів, петлевих діуретиків, препаратів платини, циклоспорину) та/або речовин, які виводяться шляхом тубулярної секреції (пробенецид, пеніцилін), може призводити до зниження кліренсу пеметрекседу. Подібні комбінації слід застосовувати з обережністю. За необхідності кліренс креатиніну слід ретельно контролювати.

Пеметрексед піддається незначному метаболізму в печінці. Результати досліджень *in vitro* з мікросомами печінки людини дають можливість припустити, що пеметрексед клінічно значуще не інгібє кліренс препаратів, які метаболізуються за допомогою CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 і CYP1A2.

Застосування перорально добавки фолієвої кислоти та внутрішньом'язове застосування добавки вітаміну В12 не впливає на фармакокінетику пеметрекседу. Застосування пеметрекседу не впливає на загальний кліренс платини.

Хоча в пацієнтів з нормальнюю нирковою функцією (кліренс креатиніну ≥ 80 мл/хв) НПЗЗ в помірних дозах можуть бути супутньо застосовані разом з пеметрекседом, нирковий кліренс зменшувався на 16 % під час застосування ібуuprofenу супутньо з пеметрекседом у пацієнтів з нормальнюю функцією нирок. У пацієнтів з нормальнюю нирковою функцією високі дози нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП, таких як ібуuprofen >1600 мг/добу) та ацетилсаліцилової кислоти ($\geq 1,3$ г/добу) можуть знижувати виведення пеметрекседу і, таким чином, підвищувати частоту виникнення побічних реакцій. Тому слід з обережністю призначати високі дози нестероїдних протизапальних препаратів або ацетилсаліцилової кислоти разом з пеметрекседом пацієнтам з нормальнюю нирковою функцією. Пацієнтам з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (кліренс креатиніну 45–79 мл/хв) слід уникати супутнього застосування пеметрекседу з НПЗП (наприклад ібуuprofenом або ацетилсаліциловою кислотою). Пацієнтам з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості слід уникати застосування НПЗП з коротким періодом напіврозпаду протягом 2 днів до застосування пеметрекседу, в день його застосування та протягом 2 днів після застосування.

За відсутності даних відносно потенційної взаємодії з НПЗП, які мають тривалий період напіврозпаду, таких як піроксикам або рофекоксіб, супутне застосування цих препаратів пацієнтам з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості слід припинити за 5 днів до застосування пеметрекседу, в день його застосування та протягом 2 днів після цього. Якщо супутне застосування НПЗП необхідне, слід ретельно контролювати стан пацієнта щодо явищ токсичності, особливо мілосупресії та шлунково-кишкової токсичності.

Взаємодії, притаманні усім цитотоксинам.

Через підвищений ризик тромбоутворення онкохворим часто застосовують антикоагулянтну терапію. Висока індивідуальна варіабельність коагуляційного статусу протягом хвороби та ймовірність взаємодії між пероральними антикоагулянтами та препаратами протипухлинної хіміотерапії вимагають підвищення частоти контролю МНВ (міжнародне нормалізоване відношення), якщо було прийнято рішення про застосування пероральних антикоагулянтів таким пацієнтам.

Сумісне застосування протипоказане: вакцина проти жовтої лихоманки – через ризик розвитку летальної генералізованої вакцинної хвороби (див. розділ «Протипоказання»).

Сумісне застосування не рекомендується: живі ослаблені вакцини (крім вакцини проти жовтої лихоманки, для якої сумісне застосування протипоказане) – через ризик системного, можливо летального, захворювання. Ризик підвищується у разі, якщо пацієнт вже має імуносупресію через наявне захворювання. У такому випадку слід використовувати інактивовану вакцину, якщо така існує (наприклад, вакцина проти поліоміеліту).

Особливості застосування.

Пеметрексед слід застосовувати під наглядом кваліфікованого лікаря з досвідом лікування протипухлинними препаратами. Належне управління ускладненнями можливе лише за наявності відповідного діагностичного та лікувального обладнання.

Пеметрексед може пригнічувати функцію кісткового мозку, що проявляється у вигляді анемії, нейтропенії, тромбоцитопенії, або панцитопенії. (див. розділ «Побічні реакції»). Мієlosупресія, зазвичай, є дозолімітуючою токсичною. Протягом лікування у пацієнтів слід контролювати мієlosупресію, а пеметрексед не слід застосовувати пацієнтам до повернення абсолютноного числа нейтрофілів (ANC) до значення $\geq 1,5 \times 10^9/\text{л}$, а числа тромбоцитів до значення $\geq 100 \times 10^9/\text{л}$. Зменшення дози в наступних циклах базується на таких показниках: мінімальне значення абсолютної кількості нейтрофілів (ANC), кількість тромбоцитів та максимально сильні прояви негематологічної токсичності, що спостерігались у попередньому циклі лікування (див. розділ «Способ застосування та дози»).

Пацієнтам, які отримують терапію пеметрекседом, слід рекомендувати прийом фолієвої кислоти та вітаміну B₁₂ з пеметрекседом із профілактичною метою, для зменшення пов'язаної з терапією токсичності, (див. розділ «Способ застосування та дози»). У дослідженні мезотеліоми повідомлялось про меншу загальну токсичність і зниження гематологічної і негематологічної токсичності 3/4-го ступеня, такої як нейтропенія, фебрильна нейтропенія та інфекція з нейтропенією 3/4-го ступеня, якщо попередньо застосувалися фолієва кислота та вітамін B₁₂.

Тяжкі ниркові розлади, зокрема гостра ниркова недостатність, спостерігалися як при монотерапії пеметрекседом, так і при застосуванні в комбінації з іншими хіміотерапевтичними препаратами. Більшість пацієнтів, у яких виникали такі розлади, мали фактор ризику виникнення ниркових розладів, зокрема зневоднення, артеріальну гіпертензію або діабет. У постмаркетинговому періоді повідомлялось про випадки нецукрового ниркового діабету та некрозу ниркових каналців як при монотерапії пеметрекседом, так і при застосуванні в комбінації з іншими хіміотерапевтичними препаратами. Більшість з цих випадків зникали після відміни пеметрекседу. За станом пацієнтів слід уважно спостерігати, на предмет можливого розвитку гострого тубулярного некрозу або порушення ниркової функції, ознак та симптомів нефрогенного нецукрового діабету (наприклад, гіпернатріемія). Спостерігалися випадки тяжкого зневоднення, пов'язаного зі шлунково-кишковою токсичною при застосуванні пеметрекседу в комбінації з цисплатином. Тому пацієнтам слід призначати адекватну протиблі沃тичну терапію та відповідну гідратацію до та/або після лікування.

Серйозні серцево-судинні події, зокрема інфаркт міокарда та цереброваскулярні порушення, нечасто спостерігалися під час клінічних досліджень пеметрекседу, зазвичай при призначенні комбінації пеметрекседу з іншими цитотоксичними препаратами. Більшість пацієнтів, у яких такі випадки були зареєстровані, мали попередні серцево-судинні фактори ризику.

У більшості онкохворих пацієнтів спостерігається пригнічення функції імунної системи. Тому сумісне застосування живих ослаблених вакцин не рекомендоване.

Випадки променевого пневмоніту реєструвалися в пацієнтів, які отримували променеву терапію до, під час або після терапії пеметрекседом. Таким пацієнтам повинна приділятися особлива увага і їм треба з особливою обережністю використовувати інші радіосенсибілізуючі препарати. Повідомлялося про випадки місцевих запальних реакцій попередньо опромінених ділянок у пацієнтів, які отримували променеву терапію за тижні або роки раніше.

Пацієнти з нирковою недостатністю

Пеметрексед виводиться переважно нирками в незміненому вигляді. Клінічний досвід застосування препарату пацієнтам з кліренсом креатиніну нижче 45 мл/хв обмежений. Тому не слід застосовувати пеметрексед пацієнтам із кліренсом креатиніну < 45 мл/хв (див. розділ «Способ застосування та дози»).

Пацієнтам з нирковою недостатністю легкого та середнього ступеня тяжкості (кліренс креатиніну 45–79 мл/хв) слід уникати супутнього застосування пеметрекседу з НПЗП, такими, як ібупрофен, ацетилсаліцилова кислота (> 1,3 г/добу) за два дні до застосування, у день застосування та 2 дні після застосування пеметрекседу).

Пацієнти з легким та помірним ступенем ниркової недостатності, для яких прийнятна терапія пеметрекседом, супутнє застосування НПЗП із тривалим періодом напіввиведення слід припинити як мінімум за 5 днів до застосування, у день застосування, та 2 дні після застосування пеметрекседу (див. розділ «Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій»).

Пацієнти з печінковою недостатністю

Пеметрексед піддається незначному метаболізму в печінці. Вплив препарату в пацієнтів з порушеннями функції печінки, такими як підвищення рівня білірубіну в > 1,5 рази від верхньої межі норми (ВМН) або амінотрансферази в > 3 рази від ВМН (відсутні метастази в печінці), або в > 5 разів від ВМН (наявні метастази в печінці), окремо не вивчали.

Реакції з боку шкіри спостерігались у пацієнтів, які попередньо не отримували терапію кортикостероїдами. Попереднє лікування дексаметазоном (або еквівалентом) може зменшувати кількість випадків і ступінь тяжкості шкірних реакцій (див. розділ «Способ застосування та дози»).

Більшість побічних ефектів, пов'язаних з лікуванням пеметрекседом у клінічних дослідженнях, були зворотними.

Вплив на пеметрексед порожнинних рідин, таких як плевральний випіт та асцит, не встановлений повною мірою. Перед призначенням пеметрекседу пацієнтам зі значним об'ємом порожнинної рідини слід розглянути питання про доцільність дренування.

Генотоксичність

Пеметрексед може спричинити генетичні порушення. Статево зрілим чоловікам рекомендується планувати батьківство протягом лікування пеметрекседом та протягом 6 місяців після терапії. Рекомендується використовувати засоби контрацепції або утриматись від статевих контактів.

Фертильність

Пеметрексед може спричиняти необоротне безпліддя, тому чоловікам рекомендується вжити заходів щодо зберігання сперми перед початком лікування пеметрекседом.

Жінки, які можуть завагітніти, повинні використовувати ефективні засоби контрацепції протягом лікування пеметрекседом.

Дослідження для оцінки канцерогенного потенціалу пеметрекседу не проводилися.

Повідомлялося про випадки «радіаційної пам'яті» у пацієнтів, які отримували лікування у попередні тижні або роки.

Застосування у період вагітності або годування грудю.

Контрацепція

Жінки дітородного віку повинні використовувати ефективні засоби контрацепції протягом лікування пеметрекседом.

Вагітність

Не слід застосовувати пеметрексед у період вагітності через потенційну небезпеку для плоду. Застосування пеметрекседу у період вагітності може викликати серйозні вроджені вади. У дослідженнях на тваринах пеметрексед виявив тератогенну дію (включаючи розщеплення тканин піднебіння), також спостерігались інші токсичні ефекти на ембріофетальний розвиток (ембріофетальна загибель, зниження ваги плоду та неповна осифікація).

Годування груддю

Невідомо, чи проникає пеметрексед у молоко людини. Не виключено появи побічних реакцій у немовлят, що знаходяться на грудному вигодуванні. Тому під час лікування пеметрекседом слід припинити грудне вигодування.

Вплив на фертильність

Зважаючи на властивість пеметрекседу спричиняти необоротне безпліддя, чоловікам рекомендується вжити заходів щодо зберігання сперми перед початком лікування пеметрекседом.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не проводилося жодних досліджень здатності пеметрекседу впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Однак повідомляється, що пеметрексед може спричиняти втому. Тому пацієнтам слід бути уважними під час керування автомобілем або іншими механізмами.

Спосіб застосування та дози.

Пеметрексед слід застосовувати під наглядом кваліфікованого лікаря з досвідом лікування протипухлинними препаратами.

Застосування комбінації пеметрекседу з цисплатином:

Рекомендована доза пеметрекседу становить 500 mg/m^2 площи поверхні тіла (ППТ) у вигляді внутрішньовенної інфузії, що вводиться протягом 10 хвилин у перший день кожного 21-денного циклу.

Рекомендована доза цисплатину становить 75 mg/m^2 ППТ у вигляді інфузії, що вводиться протягом 2 годин, приблизно через 30 хвилин після завершення інфузії пеметрекседу в перший день кожного 21-денного циклу. *Пацієнт повинен отримувати адекватну протиблювотну терапію та належну гідратацію до або/та після введення цисплатину.* Детальні рекомендації щодо дозування цисплатину - див. інструкцію для медичного застосування цисплатину.

Застосування як монотерапії:

Для лікування недрібноклітинного раку легенів (НДРЛ) після попередньо проведеної хіміотерапії рекомендована доза пеметрекседу становить 500 mg/m^2 ППТ у вигляді внутрішньовенної інфузії, що вводиться протягом 10 хвилин у перший день кожного 21-денного циклу.

Режим премедикації

З метою зниження частоти та тяжкості реакцій з боку шкіри слід застосовувати кортикостероїди за день до призначення пеметрекседу, в день його призначення та в день після його введення. Доза кортикостероїду має бути еквівалентна 4 мг дексаметазону перорально двічі на день (див. розділ «Особливості застосування»).

Для зменшення токсичності пацієнтам, які отримують лікування пеметрекседом, необхідно призначити перорально низькі дози препаратів фолієвої кислоти або полівітаміни, що містять фоліеву кислоту (350 – 1000 мкг), щоденно. Протягом 7-денного періоду перед першою дозою пеметрекседу слід прийняти не менше 5 доз фолієвої кислоти, прийом фолієвої кислоти повинен продовжуватися протягом усього курсу терапії та протягом 21 дня після введення останньої дози пеметрекседу. Пацієнтам також слід застосовувати вітамін В₁₂ (1000 мкг) внутрішньом'язово 1 раз на день протягом тижня перед першою дозою пеметрекседу та 1 раз

через кожні 3 цикли після цього. Наступні ін'екції вітаміну В₁₂ можна проводити в день введення пеметрекседу.

Лабораторний моніторинг і рекомендації щодо модифікації дози

Моніторинг

У пацієнтів, які отримують пеметрексед, перед кожним введенням слід перевіряти показники загального аналізу крові, включно з диференційованими значеннями лейкоцитів та тромбоцитів. Перед кожним проведенням хіміотерапії слід проводити біохімічний аналіз крові для оцінки функції печінки та нирок.

Абсолютна кількість нейтрофілів (ANC) повинна становити $\geq 1,5 \times 10^9/\text{л}$, а тромбоцитів – $\geq 100 \times 10^9/\text{л}$ перед проведенням будь-якого циклу хіміотерапії.

Кліренс креатиніну має бути $\geq 45 \text{ мл}/\text{хв}$.

Рівень загального білірубіну повинен не більше ніж в 1,5 раза перевищувати нормальній. Рівень лужної фосфатази (ЛФ), аланінаміотрансферази (АлАт) та аспартатаміотрансферази (АсАт) не повинен перевищувати норму більше ніж в 3 рази. Прийнятним вважається перевищення рівнів ферментів ЛФ, АлАт та АсАт до 5 разів понад норму за умови наявності пухлини печінки.

Рекомендації щодо модифікації дози

Модифікація дози перед початком наступного циклу повинна ґрунтуватися на найменших значеннях гематологічних показників або на максимальній негематологічній токсичності після попереднього циклу терапії. Лікування можна припинити з урахуванням достатнього часу для відновлення. Після відновлення пацієнти повинні отримувати терапію відповідно до рекомендацій, наведених у таблицях 1–3, що відповідають застосуванню пеметрекседу як монотерапії або в комбінації з цисплатином.

Таблиця 1: Модифікація дози пеметрекседу (монотерапія або комбінована терапія) та цисплатину. Гематологічна токсичність

Найменше значення АКН* $< 0,5 \times 10^9/\text{л}$ та найменше значення тромбоцитів $\geq 50 \times 10^9/\text{л}$.	75 % попередньої дози (пеметрексед і цисплатин).
Найменше значення тромбоцитів $\leq 50 \times 10^9/\text{л}$ без кровотечі, без урахування найменшого значення АКН	75 % попередньої дози (пеметрексед і цисплатин).
Найменше значення тромбоцитів $< 50 \times 10^9/\text{л}$ за наявністю кровотечі ^a , без урахування найменшого значення АКН.	50 % попередньої дози (пеметрексед і цисплатин).

^a Критерії за версією загальних критеріїв токсичності (ЗКТ) Національного інституту раку, США, (CTC v2.0; NCI 1998) відповідають визначеню кровотечі \geq ЗКТ 2-го ступеня

* АКН – абсолютна кількість нейтрофілів

У разі виникнення в пацієнта ознак негематологічної токсичності (за винятком нейротоксичності) ≥ 3 ступеня, лікування пеметрекседом слід припинити до досягнення більш низьких значень або таких значень, які б відповідали вихідним перед початком терапії в цього пацієнта. Продовжувати терапію слід відповідно до рекомендацій, викладених у таблиці 2.

Таблиця 2: Модифікація дози пеметрекседу (монотерапія або комбінована терапія) та цисплатину. Негематологічна токсичність^{a,b}

	Доза пеметрекседу ($\text{мг}/\text{м}^2$)	Доза цисплатину ($\text{мг}/\text{м}^2$)
Будь-яка токсичність ступеня 3 або 4, окрім мукозиту	75 % попередньої дози	75 % попередньої дози
Будь-яка діарея, що потребує госпіталізації (незалежно від ступеня), або діарея 3-го чи 4-го ступеня	75 % попередньої дози	75 % попередньої дози

Мукозит 3-го чи 4-го ступеня	50 % попередньої дози	100 % попередньої дози
---------------------------------	-----------------------	------------------------

^a Критерій за версією загальних критеріїв токсичності Національного інституту раку, США (CTC v2.0; NCI 1998);
^b Окрім нейротоксичності.

Рекомендована модифікація дози пеметрекседу і цисплатину в разі нейротоксичності наведена у таблиці 3. При нейротоксичності 3-го або 4-го ступеня терапію пеметрекседом слід припинити.

Таблиця 3: Модифікація дози пеметрекседу (монотерапія або комбінована терапія) та цисплатину. Нейротоксичність

Ступінь ЗКТ *	Доза пеметрекседу ($\text{мг}/\text{м}^2$)	Доза цисплатину ($\text{мг}/\text{м}^2$)
0–1	100 % попередньої дози	100 % попередньої дози
2	100 % попередньої дози	50 % попередньої дози

*загальні критерії токсичності Національного інституту раку, США, (CTC v 2.0; NCI 1998)

Терапію пеметрекседом слід припинити, якщо в пацієнта спостерігається будь-яка гематологічна або негематологічна токсичність 3-го або 4-го ступеня після зниження 2 доз, або негайно припинити, якщо спостерігається нейротоксичність 3-го або 4-го ступеня.

Пацієнти літнього віку

У ході клінічних досліджень не було жодних свідчень про те, що пацієнти віком від 65 років мають більш високий ризик розвитку побічних ефектів, аніж пацієнти віком до 65 років. Відсутнія необхідність у зниженні доз, окрім рекомендованих для всіх пацієнтів.

Діти

Відсутні релевантні дані стосовно застосування пеметрекседу в педіатричній практиці для лікування злюкісної мезотеліоми плеври та недрібноклітинного раку легенів.

Пацієнти з нирковою недостатністю

Пеметрексед виводиться переважно нирками у незміненому вигляді. У процесі клінічних досліджень не було необхідності коригувати дози для пацієнтів із кліренсом креатиніну не нижче 45 $\text{мл}/\text{хв}$, окрім рекомендованих для всіх пацієнтів. Кількість пацієнтів із кліренсом креатиніну нижче 45 $\text{мл}/\text{хв}$ була недостатньою для рекомендацій щодо дозування окремо для цієї групи пацієнтів. Таким чином, застосування пеметрекседу пацієнтам, у яких кліренс креатиніну < 45 $\text{мл}/\text{хв}$, не рекомендується [при використанні стандартної формулі Кокрофта-Голта або швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), визначеній методом плазмового кліренсу $\text{Tc}99\text{m-DPTA}$].

Метод застосування

Застереження щодо приготування розчину та застосування пеметрекседу викладені в розділі «Особливі заходи безпеки». Пеметрексед слід вводити у вигляді внутрішньовенної інфузії протягом 10 хвилин у перший день кожного 21-денної циклу. Рекомендації із відновлення, розчинення та розведення препарату, рекомендації щодо приготування розчину для інфузій наведені нижче.

1. Слід дотримуватись правил асептики під час розчинення та подальшого розведення пеметрекседу для внутрішньовенної інфузії.
2. Розрахувати дозу та необхідну кількість флаконів пеметрекседу. Кожен флакон містить надлишок пеметрекседу для забезпечення отримання дози, що зазначена на маркуванні.
3. Перед введенням розчинити вміст флакона 100 мг за допомогою 4,2 мл 0,9 % розчину натрію хлориду для ін'єкції для отримання розчину, який містить 25 мг/мл пеметрекседу. **НЕОБХІДНЕ ПОДАЛЬШЕ РОЗВЕДЕННЯ.**

Вміст флакона 500 мг розчинити за допомогою 20 мл 0,9 % розчину натрію хлориду для ін'єкції для отримання розчину, який містить 25 мг/мл пеметрекседу. pH отриманого розчину становить 6,6–7,8. **НЕОБХІДНЕ ПОДАЛЬШЕ РОЗВЕДЕННЯ.**

Обережно струсити кожен флакон до повного розчинення порошку. Отриманий розчин має бути прозорим, без сторонніх часток, колір від безбарвного до жовтого або зелено-жовтого кольору, що не впливає на якість препарату.

4. Необхідний об'єм отриманого розчину пеметрекседу далі потрібно розвести до 100 мл за допомогою 0,9 % розчину натрію хлориду і вводити у вигляді внутрішньовенної інфузії протягом 10 хвилин.

5. Розчин пеметрекседу для інфузій, приготовлений, як описано вище, є сумісним з інфузійними пакетами та наборами для введення інфузій з полівінілхлориду та поліолефіну.

6. Препарати для внутрішньовенного введення слід перевіряти візуально для виявлення сторонніх частинок і знебарвлення перед введенням. У разі наявності сторонніх часток розчин не можна застосовувати.

7. Розчин пеметрекседу призначений для одноразового індивідуального використання.

Розчинення та подальше розведення пеметрекседу для внутрішньовенної інфузії рекомендується лише 0,9 % розчином натрію хлориду. Пеметрексед фізично несумісний з розчинниками, що містять кальцій, зокрема з розчином Рінгера і лактатом Рінгера. Сумісність пеметрекседу з іншими препаратами і розчинниками не досліджувалася, тому його не рекомендується змішувати з будь-яким іншим препаратом.

Хімічна та фізична стабільність розчиненого ліофілізату та розчину для інфузій пеметрекседу спостерігалася протягом 24 годин після розчинення оригінального флакону за умови зберігання при температурі не вище 25 °C. Проте, оскільки пеметрексед і рекомендований розчинник не містять протимікробних консервантів, з метою зменшення антимікробного ризику, приготовлений розчин для інфузій слід використати негайно.

Невикористаний лікарський засіб або відходи слід знищити відповідно до затверджених вимог медичного закладу.

Діти.

Пеметрексед не рекомендується для застосування у пацієнтів молодше 18 років, оскільки безпека та ефективність препарату в цій групі хворих не встановлена.

Передозування.

Повідомлялося про такі симптоми передозування пеметрекседу, як нейтропенія, анемія, тромбоцитопенія, мукозит, сенсорна полінейропатія і висипання. Передбачувані ускладнення при передозуванні включають пригнічення функції кісткового мозку, що проявляється нейтропенією, тромбоцитопенією та анемією. Крім того, можливі інфекція як з лихоманкою, так і без неї, діарея та/або мукозит.

У випадку підозри на передозування необхідно контролювати стан пацієнта, призначити відповідні аналізи, зокрема розгорнутий аналіз крові, та призначити симптоматичну терапію за необхідності. Під час лікування передозування пеметрекседу слід розглянути можливість застосування фолінату кальцію/фолінової кислоти або тимідину.

Побічні реакції.

Побічні реакції при застосуванні пеметрекседу, як в монотерапії, так і при комбінованому застосуванні, про які найчастіше повідомлялося: супресія кісткового мозку, що проявляється у вигляді анемії, нейтропенії, лейкопенії та тромбоцитопенії, а також шлунково-кишкова токсичність, що проявляється як анорексія, нудота, блевання, діарея, запор, фарингіт, мукозит і стоматит. Інші побічні реакції включають ниркову токсичність, підвищення рівня амінотрансфераз, алопецію, слабкість, дегідратацію, висипання, інфекцію/сепсис, нейропатію. Рідко повідомлялося про синдром Стівенса–Джонсона та токсичний епідермальний некроліз.

Пеметрексед у якості монотерапії (НДРЛ):

У Таблиці 4 зазначено частоту та тяжкість побічних ефектів, які спостерігалися у пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для монотерапії пеметрекседом із застосуванням фолінової кислоти та вітаміну В₁₂, а також пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для монотерапії

доцетакселом. У всіх пацієнтів був діагностований місцеворозповсюдженій або метастатичний НДРЛ, і всі вони отримували попередню хіміотерапію.

Таблиця 4

Клас системи органів	Частота	Симптоми*	Пеметрексед (N = 265)		Доцетаксел (N = 276)	
			Токсичність будь-якого ступеня (%)	Токсичність 3–4 ступеня (%)	Токсичність будь-якого ступеня (%)	Токсичність 3–4 ступеня (%)
Розлади з боку кровоносної та лімфатичної системи	Дуже часто	Зниження рівня гемоглобіну	19,2	4,2	22,1	4,3
		Зниження рівня лейкоцитів	12,1	4,2	34,1	27,2
		Зниження рівня нейтрофілів/гранулоцитів	10,9	5,3	45,3	40,2
	Часто	Зниження рівня тромбоцитів	8,3	1,9	1,1	0,4
Шлунково-кишкові розлади	Дуже часто	Нудота	30,9	2,6	16,7	1,8
		Втрата апетиту, анорексія	21,9	1,9	23,9	2,5
		Блювання	16,2	1,5	12,0	1,1
		Стоматит/фарингіт	14,7	1,1	17,4	1,1
		Діарея	12,8	0,4	24,3	2,5
	Часто	Закреп	5,7	0,0	4,0	0,0
Загальні розлади	Дуже часто	Втома	34,0	5,3	35,9	5,4
	Часто	Лихоманка	8,3	0,0	7,6	0,0
Гепатобіліарні розлади	Часто	Підвищення рівня АЛАт (SGPT)	7,9	1,9	1,4	0,0
		Підвищення рівня АсАт (SGOT)	6,8	1,1	0,7	0,0
Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини	Дуже часто	Висипання/десквамація	14,0	0,0	6,2	0,0
	Часто	Свербіж	6,8	0,4	1,8	0,0
		Алопеція	6,4	0,4**	37,7	2,2**

*Посилання на загальні критерії токсичності Національного інституту раку, США, за лабораторними значеннями для кожного ступеня токсичності (версія 2.0).

**Відповідно до зазальних критеріїв токсичності Національного інституту раку, США, (версія 2.0), алопеція повинна зазначатися як токсичність 1-го або 2-го ступеня.

Дуже часто: ≥ 10 %; Часто: > 5 % і < 10 % (у цій таблиці 5 % межа введена для включення всіх симптомів, які розглядалися як можливо пов'язані з пеметрекседом).

Клінічно значуча токсичність за загальними критеріями токсичності (ЗКТ), яка спостерігалася в ≥ 1 % та ≤ 5 % пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії

пеметрекседом, включала сенсорну нейропатію, рухову нейропатію, біль у животі, підвищення рівня креатиніну, фебрильну нейтропенію, інфекцію без нейтропенії, алергічні реакції/гіперчувствливість та мультиформну еритему.

Клінічно значуща, відповідно ЗКТ, токсичність, яка спостерігалася в < 1 % пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії пеметрекседом, включала надшлуночкові аритмії. Клінічно значущі лабораторні показники загальної токсичності 3-го та 4-го ступеня були подібні до інтегрованих результатів фази 2 у ході трьох досліджень монотерапії пеметрекседом та фази 3 у ході дослідження, яке було описано вище, за винятком нейтропенії та підвищення рівня аланінамінотрансферази. Ці розбіжності, ймовірно, були результатом розбіжностей у популяціях пацієнтів, оскільки дослідження фази 2 включали пацієнтів, які не отримували хіміотерапії, та тих, які отримували масивну попередню терапію раку молочної залози з раніше існуючими метастазами в печінку та/або вихідними відхиленнями печінкових тестів.

Комбінація з цисплатином (ЗМП):

У Таблиці 5 зазначено частоту та тяжкість побічних ефектів, які спостерігалися у пацієнтів з мезотеліомою, відібраних випадковим шляхом для терапії пеметрекседом і цисплатином, і пацієнтів з мезотеліомою, відібраних випадковим шляхом для монотерапії цисплатином. В обох групах лікування пацієнти, які не отримували хіміотерапії, отримували фолієву кислоту та вітамін B₁₂ у повному обсязі.

Таблиця 5

Клас системи органів	Частота	Симптоми*	Пеметрексед/ цисплатин (N = 168)		Цисплатин (N = 163)	
			Токсичність будь-якого ступеня (%)	Токсичність 3–4 ступеня (%)	Токсичність будь-якого ступеня (%)	Токсичність 3–4 ступеня (%)
Розлади з боку кровоносної та лімфатичної системи	Дуже часто	Зниження кількості нейтрофілів	56,0	23,2	13,5	3,1
		Зниження кількості лейкоцитів	53,0	14,9	16,6	0,6
		Зниження кількості гемоглобіну	26,2	4,2	10,4	0,0
		Зниження кількості тромбоцитів	23,2	5,4	8,6	0,0
Хвороби очей	Часто	Кон'юнктивіт	5,4	0,0	0,6	0,0
Шлунково-кишкові розлади	Дуже часто	Нудота	82,1	11,9	76,7	5,5
		Блювання	56,5	10,7	49,7	4,3
		Стоматит/ фарингіт	23,2	3,0	6,1	0,0
		Втрата апетиту, анорексія	20,2	1,2	14,1	0,6

		Діарея	16,7	3,6	8,0	0,0
		Закреп	11,9	0,6	7,4	0,6
	Часто	Диспепсія	5,4	0,6	0,6	0,0
Загальні розлади	Дуже часто	Втома	47,6	10,1	42,3	9,2
Метаболізм та розлади харчування	Часто	Зневоднення	6,5	4,2	0,6	0,6
Розлади нервової системи	Дуже часто	Сенсорна нейропатія	10,1	0,0	9,8	0,6
	Часто	Порушення смаку	7,7	0,0***	6,1	0,0***
Ниркові розлади	Дуже часто	Зниження кліренсу креатиніну**	16,1	0,6	17,8	1,8
		Підвищення рівня креатиніну	10,7	0,6	9,8	1,2
		Сечостатева система Інше	16,7	0,6	18,4	2,5
Розлади шкіри та підшкірної клітковини	Дуже часто	Висип	16,1	0,6	4,9	0,0
		Алопеція	11,3	0,0***	5,5	0,0***

* Відповідно до ЗКТ Національного інституту раку, США, (CTC V 2.0; NCI 1998) для кожного ступеня токсичності, за виключенням терміну «зниження кліренсу креатиніну»**, який є похідним з розділу ЗКТ «ниркова/сечостатева система – інше».

*** Відповідно до ЗКТ Національного інституту раку, США, (CTC V 2.0; NCI 1998), алопеція і порушення смаку повинні зазначатися як токсичність 1-го або 2-го ступеня.

Дуже часто: $\geq 10\%$; Часто: $> 5\% \text{ i } < 10\%$ (у цій таблиці 5 % межа введена для включення всіх симптомів, які розглядалися як можливо пов'язані з пеметрекседом і цисплатином).

Клінічно значуща токсичність, відповідно ЗКТ, яка спостерігалася в $\geq 1\%$ та $\leq 5\%$ пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії цисплатином і пеметрекседом, включає підвищення рівня AcAt (SGOT), підвищення АлАт (SGPT) і ГГТ, інфекцію, фебрильну нейтропенію, ниркову недостатність, загруднинний біль, лихоманку і кропив'янку.

Клінічно значуща токсичність, яка спостерігалася в $< 1\%$ пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії цисплатином і пеметрекседом, включала аритмію і рухову нейропатію.

Комбінація з цисплатином (НДРЛ):

У Таблиці 6 зазначено частоту та тяжкість побічних ефектів, які вважалися можливо пов'язаними з препаратом дослідження, і які спостерігалися у пацієнтів із НДРЛ, відібраних випадковим шляхом для терапії пеметрекседом і цисплатином, а також пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії цисплатином і гемцитабіном. Всі пацієнти отримували лікування препаратом дослідження в якості терапії першої лінії при місцеворозповсюдженому або метастатичному НДРЛ, і всі пацієнти в обох групах лікування отримували фолієву кислоту та вітамін B₁₂ у повному обсязі.

Таблиця 6

Клас системи органів	Частота	Симптоми*	Пеметрексед/цисплатин (N = 839)		Гемцитабін/цисплатин (N = 830)	
			Токсичні	Токсичні	Токсичні	Токсичні

			стъ будъ- якого ступеня (%)	стъ 3-4 ступения (%)	стъ будъ- якого ступеня (%)	стъ 3-4 ступения (%)
Розлади з боку кровоносної та лімфатичної системи	Дуже часто	Зниження рівня гемоглобіну	33,0*	5,6*	45,7*	9,9*
		Зниження рівня нейтрофілів/ гранулоцитів	29,0*	15,1*	38,4*	26,7*
		Зниження рівня лейкоцитів	17,8	4,8*	20,6	7,6*
		Зниження рівня тромбоцитів	10,1*	4,1*	26,6*	12,7*
Шлунково-кишкові розлади	Дуже часто	Нудота	56,1	7,2*	53,4	3,9*
		Блювання	39,7	6,1	35,5	6,1
		Втрата апетиту, анорексія	26,6	2,4*	24,2	0,7*
		Закреп	21,0	0,8	19,5	0,4
		Стоматит/ фарингіт	13,5	0,8	12,4	0,1
		Діарея без колостоми	12,4	1,3	12,8	1,6
	Часто	Диспепсія/ печія	5,2	0,1	5,9	0,0
Загальні порушення та місцеві ускладнення в місці введення препарату	Дуже часто	Втома	42,7	6,7	44,9	4,9
Розлади нервової системи	Часто	Сенсорна нейропатія	8,5*	0,0*	12,4*	0,6*
		Порушення смаку	8,1	0,0***	8,9	0,0***
Порушення з боку нирок та сечовидільної системи	Дуже часто	Підвищення рівня креатиніну	10,1*	0,8	6,9*	0,5
Порушення з боку шкіри та підшкірної клітковини	Дуже часто	Алопеція	11,9*	0***	21,4*	0,5***
	Часто	Висипання/ десквамація	6,6	0,1	8,0	0,5

*Р-значення ≤ 0,05 при порівнянні комбінацій пеметрексед/цисплатин та гемцитабін/цисплатин, отримане з використанням точного тесту Фішера. ** Відповідно до ЗКТ Національного інституту раку, США, (СTC V 2.0; NCI 1998) для кожного ступеня токсичності.

*** Відповідно до загальних критеріїв токсичності Національного інституту раку, США, (СTC V 2.0; NCI 1998), алопеція і порушення смаку повинні зазначатися як токсичність 1-го або 2-го ступеня.

Дуже часто: ≥ 10 %; Часто: > 5 % і < 10 %. У цій таблиці 5 % межа введена для включення всіх симптомів, які розглядалися як можливо пов'язані з пеметрекседом і цисплатином.

Клінічно значуча токсичність, яка спостерігалася у клінічних дослідженнях в ≥ 1 % і ≤ 5 % пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії цисплатином і пеметрекседом, включала: підвищення рівня AcAt, підвищення АлАт, інфекцію, фебрильну нейтропенію, ниркову недостатність, лихоманку, дегідратацію, кон'юнктивіт та зниження кліренсу креатиніну.

Клінічно значуча токсичність, яка спостерігалася в < 1 % пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії цисплатином і пеметрекседом, включала: підвищення рівня ГГТ, загруднинний біль, аритмію і рухову нейропатію. Гостра ниркова недостатність спостерігалася частіше в групі пеметрексед/цисплатин (6 випадків, 0,7 %), ніж у групі гемцитабін/цисплатин (0 випадків).

Пеметрексед у якості монотерапії (підтримуюча терапія при НДРЛ)

У Таблиці 7 зазначено частоту та тяжкість побічних ефектів, які розглядалися у клінічних дослідженнях як можливо пов'язані з препаратом дослідження і спостерігалися у пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для монотерапії пеметрекседом, а також 402 пацієнтів, відібраних випадковим шляхом для терапії плацебо, під час дослідження з застосуванням виключно пеметрекседу для підтримуючої терапії та для терапії пеметрекседом в ході дослідження тривалої підтримуючої терапії. У всіх пацієнтів був діагностований НДРЛ ПІВ або IV ступеня, і їм попередньо застосовувалася хіміотерапія препаратами платини. Пацієнти в обох групах лікування отримували фоліеву кислоту та вітамін B₁₂ у повному обсязі.

Таблиця 7

Клас системи органів	Частота ^a	Симптоми ^b	Пеметрексед (N = 800) ^c		Плацебо (N = 402) ^c	
			Токсичність будь-якого ступеня (%)	Токсичність 3–4 ступеня (%)	Токсичність будь-якого ступеня (%)	Токсичність 3–4 ступеня (%)
Розлади з боку кровоносної та лімфатичної системи	Дуже часто	Зниження рівня гемоглобіну	18,0	4,5	5,2	0,5
		Лейкоцитопенія	5,8	1,9	0,7	0,2
	Часто	Нейтропенія	8,4	4,4	0,2	0,0
Шлунково-кишкові розлади	Дуже часто	Нудота	17,3	0,8	4,0	0,2
		Втрата апетиту, анорексія	12,8	1,1	3,2	0,0
	Часто	Блювання	8,4	0,3	1,5	0,0
		Мукозит/стоматит	6,8	0,8	1,7	0,0
Загальні порушення та місцеві	Дуже часто	Втома	24,1	5,3	10,9	0,7
	Часто	Біль	7,6	0,9	4,5	0,0

ускладнення в місці введення препарату		Набряки	5,6	0,0	1,5	0,0
Гепатобіліарні розлади	Часто	Підвищення рівня АлАт (SGPT)	6,5	0,1	2,2	0,0
		Підвищення рівня АсАт (SGOT)	5,9	0,0	1,7	0,0
Розлади з боку шкіри та підшкірної клітковини	Дуже часто	Висипання/десквамація	8,1	0,1	3,7	0,0
Розлади нервової системи	Часто	Сенсорна нейропатія	7,4	0,6	5,0	0,2
Ниркові розлади	Часто	Ниркові розлади	7,6	0,9	1,7	0,0

Абревіатури та терміни: АлАт – аланінаміотрансфераза; АсАт – аспартатаміотрансфераза; NCI – Національний інститут раку, США; СТСАЕ – загальні критерії токсичності побічних явищ; SGOT – сироваткова глутамінова оксалоацетинова трансаміназа; SGPT — сироваткова глутамінова піровиноградна трансаміназа.

^a Визначення частоти: Дуже часто — > 10 %; часто — > 5 % і < 10 %. У цій таблиці 5 % межа введена для включення всіх симптомів, які розглядалися як можливо пов'язані з пеметрекседом.

^b Посилання на критерії Національного інституту раку, США, загальні критерії токсичності за лабораторними значеннями для кожного ступеня токсичності (CTC, v 3.0, NCI 2003).

^c Узагальнений термін, що включає підвищення рівня креатиніну в крові/сироватці, зниження рівня клубочкової фільтрації, ниркову недостатність, інші явища з боку нирок та сечостатевої системи.

Клінічно значуща токсичність, яка спостерігалася в > 1 % і < 5 % (часто) пацієнтів, відбраних випадковим шляхом для терапії пеметрекседом, включає: зменшення кліренсу креатиніну, закреп, діарея, набряки, алопецію, підвищений рівень креатиніну, висипання/свербіж, зниження рівня тромбоцитів, лихоманку (без нейтропенії), захворювання очей (включно з кон'юнктивітом), підвищену слізозотечу, зниження рівня клубочкової фільтрації, запаморочення і рухова нейропатія.

Клінічно значуща токсичність, яка спостерігалася в < 1 % пацієнтів (рідко), відбраних випадковим шляхом для терапії пеметрекседом, включає: лихоманку, нейтропенію, фебрильну нейтропенію, алергічні реакції/гіперчутливість, рухову нейропатію, мультиформну еритему, ниркову недостатність, надшлуночкову аритмію, емболію легеневої артерії.

Безпека застосування оцінювалася в пацієнтів, відбраних випадковим шляхом для терапії пеметрекседом. Частота виникнення побічних реакцій оцінювалася у пацієнтів, які отримали ≤ 6 циклів підтримуючого лікування пеметрекседом, порівняно з пацієнтами, які отримали > 6 циклів лікування пеметрекседом. Підвищення частоти виникнення побічних реакцій (всіх ступенів тяжкості) спостерігалося зі збільшенням тривалості застосування. Значне підвищення частоти виникнення побічного явища, можливо пов'язаного із застосуванням лікарського засобу, у вигляді нейтропенії 3-го або 4-го ступеня спостерігалося зі збільшенням тривалості застосування пеметрекседу (≤ 6 циклів: — 3,3 %; > 6 циклів: — 6,4 %; $p = 0,046$). Не спостерігалося статистично значущої різниці в частоті виникнення інших окремих побічних явищ 3-го, 4-го та 5-го ступенів зі збільшенням тривалості застосування.

Про серйозні кардіоваскулярні та цереброваскулярні події, включаючи інфаркт міокарда, стенокардію, порушення мозкового кровообігу та транзиторну ішемічну атаку, повідомлялося нечасто у ході клінічних досліджень пеметрекседу, звичайно у разі комбінації з іншими цитотоксичними агентами. Більшість пацієнтів, у яких були зареєстровані такі випадки, мали фактори кардіоваскулярного ризику в анамнезі.

У ході клінічних досліджень про випадки сепсису, іноді летальні, повідомлялося приблизно у 1 % пацієнтів.

Про випадки езофагіту повідомлялося нечасто в процесі клінічних досліджень пеметрекседу. Про випадки панцитопенії нечасто повідомлялося у ході клінічних досліджень пеметрекседу. У ході клінічних досліджень нечасто повідомлялося про випадки колітів (включаючи кишкові та ректальні кровотечі, іноді летальні, кишкові перфорації, кишкові некрози та запалення сліпої кишки) у пацієнтів, які лікувалися пеметрекседом.

У ході клінічних досліджень нечасто повідомлялося про випадки інтерстиціального пневмоніту з респіраторною недостатністю, іноді летальною, у пацієнтів, які лікувалися пеметрекседом.

Дані постмаркетингових досліджень:

Розлади з боку шлунково-кишкового тракту

У процесі клінічних досліджень нечасто повідомлялося про випадки колітів у пацієнтів, які лікувалися пеметрекседом.

Розлади з боку нирок

Нечасто повідомлялося про випадки гострої ниркової недостатності як при монотерапії пеметрекседом, так і при комбінованій терапії з іншими хіміотерапевтичними препаратами.

З боку системи дихання

Нечасто повідомлялося про випадки радіаційного пневмоніту у пацієнтів, які отримували радіаційну терапію до, під час чи після лікування пеметрекседом.

Реакції з боку імунної системи

Рідко повідомлялося про випадки анафілактичного шоку.

Загальні порушення та місцеві ускладнення в місці введення препарату

Про випадки набряків у пацієнтів, які отримували лікування пеметрекседом, повідомлялося нечасто.

Травми, отруєння, ускладнення

Рідко повідомлялося про випадки «радіаційної пам'яті» у пацієнтів, які раніше отримували радіаційну терапію.

Нечасто повідомлялося про випадки периферичної ішемії, що часом призводила до некрозу кінцівки.

Шкірні реакції

Рідко повідомлялося про бульозні стани, в т. ч. синдром Стівенса–Джонсона та токсичний епідермальний некроліз, які в окремих випадках були летальні. З невідомою частотою повідомлялося про розвиток ексудативної еритеми переважно нижніх кінцівок.

Порушення з боку крові та лімфатичної системи

Рідко повідомлялося про імуноопосередковану гемолітичну анемію в пацієнтів, які отримували пеметрексед.

Гепатобіліарні розлади

У процесі клінічних досліджень рідко повідомлялося про випадки потенційно серйозних гепатитів у пацієнтів, які отримували пеметрексед.

Термін придатності. Для 100 мг - 3 роки. Для 500 мг - 2 роки.

Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Несумісність.

Пеметрексед фізично несумісний з розчинниками, що містять кальцій, зокрема з розчином Рінгера і лактатом Рінгера. Сумісність пеметрекседу з іншими препаратами і розчинниками не досліджувалася, тому його не рекомендується змішувати з будь-яким іншим препаратом.

Упаковка. 1 флакон з порошком у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептром.

Виробник. Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд (Виробничий відділ - 7).

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.
Дільниця № P1-P9, Фаза - III, ВСЕЗ, Дювада, Візакхапатнам Дистрикт, Андра Прадеш, Індія.

Дата останнього перегляду.

